



## IMPFKALENDER

Sprache: Deutsch

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der  
Ständigen Impfkommission  
(STIKO) 2017/18.  
www.stiko.de

## ROBERT KOCH INSTITUT



ALTER	Säuglinge				Kleinkinder		Kinder			Jugendliche		Erwachsene	
	(in Wochen)	(in Monaten)			11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	ab 18	ab 60
IMPfung	6	2	3	4	U4	U5	U7	U7A/B	U9	U10	J		
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A	ⓐ
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A	ⓐ
Keuchhusten Pertussis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A	ⓐ
Kinderlähmung Polio(myelitis)		G1	G2	G3	G4	N				A1			ⓐ
Hepatitis B		G1	G2	G3	G4	N							
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2	G3	G4	N							
Pneumokokken		G1		G2	G3	N						S	ⓐ
Rotaviren	G1	G2	(G3)										
Meningokokken Serogruppe C					G1		N						
Masern					G1	G2	N					S	ⓐ
Mumps Röteln					G1	G2	N						
Windpocken Varizellen					G1	G2	N						
Grippe Influenza												S	ⓐ
HPV Humane Papillomviren												G1	G2

Nächste Impftermine

---



---




---



---



---



### ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Frühkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J) im Alter von 12–14 Jahren

- ⓐ Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- ⓑ Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- ⓒ Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff; Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- ⓓ Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen > 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugswahl mit einem mRNA-Impfstoff.

- ⓔ Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Für Nachholimpfungen und Anzahl der Impfstoffdosen Fachinformation beachten.
- ⓕ Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- ⓖ Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.